

ПАМ'ЯТКА АГРОНОМУ

ЯК ПРАЦЮЄМО НА РІПАКУ З ОСЕНІ

РІПАК – є однією з найбільш рентабельних культур які вирощують аграрії в Україні. І тому привертає все більше уваги. Для отримання високих врожаїв, окрім дотримання високого рівня агротехніки і захисту, важливо приділити увагу підживленню і використанню не лише регуляторів росту, а й **антистресантів** і **стимуляторів росту**, які є у портфелі компанії «Агротехносоюз».



РОБОТА В ОСІННІЙ ПЕРІОД

- В баковій суміші з ретардантами застосовувати **Гуміфілд ВР-18 в.с.** нормою 0,4 л/га.
- Якщо рослини в стресі – застосовувати **Гуміфілд Форте Аміно в.с.** нормою 0,4 л/га.
- Для стимулювання росту рослин застосовувати **Фульвітал Плюс з.п.** нормою 0,15 кг/га.



1 ПРИ ВИРОЩУВАННІ РІПАКУ АГРАРІЯМ ПОТРІБНО БУТИ ГОТОВИМИ ДО ПОСІВУ НЕ В ОПТИМАЛЬНІ СТРОКИ І УМОВИ ДЛЯ РОСТУ КУЛЬТУРИ.



Оптимальні строки і умови посіву:

- 1 північно-західні регіони – до 5 серпня;
 - 2 центральні – до 15-25 серпня;
 - 3 південно-східні – 25-30 серпня,
- 20 мм вологи в 20 см шарі ґрунту

- **Ранній** (всі строки зміщуються на 5-10 днів раніше) і оптимальний строк посіву при достатній вологості.
- **Пізній посів в сухий ґрунт** (всі строки зміщуються на 5-10 днів пізніше).
- **Загущені посіви ріпаку** (50-60 рослин/м²).

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ РЕТАРДАНТІВ ВОСЕНИ НА ПОСІВАХ РІПАКУ

- **Якщо рослини ріпаку в стресі ретарданти не використовують**
- При **оптимальних умовах** перше внесення ретардантів рекомендується у фазу 4-5 листків, (ВВСН 14-15) повторне використання через 14-21 день.
- При **ранніх посівах** 2-х кратне внесення з фази 4-5 листків, допускається і 3-х кратне внесення регулятора росту з фази 3 листка (ВВСН 13).
- При **загущених посівах** обробку проводити у фазу 3 листка (ВВСН 13).
- При **пізніх посівах** рослини потрібно простимулювати у фазі 3-4 листків (ВВСН 13-14) до оптимального розвитку рослини (6-10 справжніх листків, діаметр кореневої шийки – 8-15 мм).

3 РОБОТА В ОСІННІЙ ПЕРІОД



- В баковій суміші з ретардантами застосовувати Гуміфілд ВР-18 в.с. нормою 0,4 л/га



- Якщо рослини в стресі – застосовувати Гуміфілд Форте Аміно в.с. нормою 0,4 л/га



- Для стимулювання росту рослин застосовувати Фульвітал Плюс з.п. нормою 0,15 кг/га.

