

ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ ОЗИМИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо застосування препаратів компанії «Агротехносоюз»
для реалізації генетичного потенціалу зернових колосових

Затрати, євро/га

Страхова	8
Прибуткова	16
Інтенсивна	32


ЗАТРАТИ ЄВРО

ПРИРІСТ Ц/ГА

СТРАХОВА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т		Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га		Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га	8,14	4-4,5
ПРИБУТКОВА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8л/т	Гуміфілд ВР-18 0,4 л/га	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га	Фульвітал Плюс 0,45 л/га	Гуміфілд Форте Аміно 0,4л/га	16,39	5-6
ІНТЕНСИВНА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8л/т	Гуміфілд Форте Аміно 0,4л/га	Фульвігрін Стимул 1 л/га	Фульвітал Плюс 0,45 л/га	Фульвігрін Антистрес 1 л/га	31,51	7-8

Фаза росту культури	Обробка насіння	Осіньне куцання	Весняне куцання	Прапорцевий листок	Формування зерна
	<ul style="list-style-type: none"> Стимулює розвиток міцної кореневої системи Підвищує польову схожість насіння Переводить недоступні елементи живлення в засвоювану форму 	<ul style="list-style-type: none"> Знімає стрес від післядії гербіцидів Стимулює ріст кореневої системи Стимулює куцання 	<ul style="list-style-type: none"> Відновлює посіви після зими, зміцнює ослаблені посіви Стимулює продуктивне куцання Знімає стрес після внесення ЗЗР 	<ul style="list-style-type: none"> Збільшує кількість зерен у колосі Підсилює живлення мікроелементами Підвищує стійкість до захворювань 	<ul style="list-style-type: none"> Підвищує стійкість до посухи і високих температур Збільшує масу 1000 насінин Підвищує вміст білку на 0,5-1,5 %, клейковини на 3-3,5 %

*При появі посухи – рекомендується проводити додаткові обробки препаратом Гуміфілд Форте Аміно нормою 0,2-0,4 л/га або препаратом Фульвігрін Антистрес нормою 0,5 л/га, кожні 10-14 днів до закінчення посухи.



На фото рослини через 14 днів після внесення препарату **Гуміфілд Форте Фульвік в.с.**, 0,4 л/га. За рахунок внесення препарату в рослин розвинулась потужніша коренева система та більша вегетативна маса.




Фото зроблене на момент внесення препарату **Гуміфілд Форте Аміно в.с.**, 0,4 л/га. Метою внесення було збільшити масу 1000 насінин та підвищити стійкість рослин до високих температур.

Ефективність застосування препаратів компанії Humintech GmbH**

Господарство	Фаза внесення	Препарат, л/га, л/т, кг/га	Урожайність, ц/га		Додаткові затрати, євро/га *	Приріст, ц/га
			Контроль	Дослід		
Тернопільська обл., Гусятинський р-н.	Обробка насіння	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т	46,2	53,3	12,7	7,1
	Внесення	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га				
	Внесення	Фульвітал Плюс 0,4 л/га				
	Внесення	Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га				
Запорізька обл., Пологівський р-н.	Кущення	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га	43,5	46,5	7,5	4,3
	Формування зерна	Фульвігрін Антистрес 0,4 л/га				
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н.	Вихід у трубку	Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га	54,9	59,4	6,4	4,5
	Початок колосіння	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га				
Чернігівська обл., Прилуцький р-н.	Обробка насіння	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т	55,6	65,6	18,8	10
	Вихід у трубку	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га				
	Прапорцевий листок	Фульвігрін Стимул 1,0 л/га				
	Налив зерна	Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га				
Харківська обл., Кегичівський р-н.	Кущення	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га	29,87	37,38	6,4	7,51
	Прапорцевий листок	Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га				
Сумська обл., Білопільський р-н.	Обробка насіння	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т	50	55	5,6	5
	Кущення (осінь)	Гуміфілд ВР-18 0,5 л/га				
Київська обл., Бориспільський р-н.	Кущення	Гуміфілд ВР-18 0,4 л/га	37,3	42	6,3	4,7
	Прапорцевий листок	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га				

* додаткові затрати розраховані за рекомендованими прайсовими цінами імпортера

** окупність застосованих препаратів складає від 10:1 до 22:1