

СОНЯШНИК

Рекомендовані технології для реалізації генетичного потенціалу соняшнику

Фаза внесення		Страхова технологія*		Прибуткова технологія*	
		Затрати 1,9- 4,5 є/га 	Приріст 1,0- 1,5 ц/га 	Затрати 3,9- 5,9 є/га 	Приріст 1,5- 2,5 ц/га 
Обробка насіння 		Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т		Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т	
2-3 пари листків 		-		Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,2-0,4 л/га (необов'язкове)	
4-5 пар листків 	достатньо вологи	-		Фульвітал Плюс в.с., 0,3-0,45 л/га	
	дефіцит вологи	-		Гуміфілд Форте Фульвік в.с., 0,2-0,4 л/га	
Зірочка 	достатньо вологи	Фульвітал Плюс в.с., 0,3-0,45 л/га		Фульвітал Плюс в.с., 0,3-0,45 л/га	
	дефіцит вологи	Гуміфілд ВР-18 в.с., 0,2-0,4 л/га		Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,2-0,4 л/га	

* Для соняшнику, стійкого до імідазолінонів або сульфонілсечовин, на третій день після внесення гербіциду застосувати антистресант! (Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га, Фульвігрейн Антистрес в.с., 0,4 л/га або Фульвігрін Антистрес в.с., 0,5 л/га).